

마약성 진통제 “옥시코돈” 안전사용 안내서 (환자용)



식품의약품안전처에서 ‘옥시코돈(정제)’의 주의사항에 대해 알려드립니다.

1. ‘옥시코돈’은 어떤 약물인가요?

- ‘옥시코돈’은 「마약류 관리에 관한 법률」에 의하여 **마약(오피오이드계)**으로 지정되어 있는 약물로서, **신체적·정신적 의존성**을 야기할 수 있습니다.

2. ‘옥시코돈’은 어떤 경우에 사용하는 것인가요?

- 의사의 처방에 따라 ‘옥시코돈’은 마약성 진통제의 사용을 필요로 하는 중등도 및 심한 통증의 완화의 목적으로 사용하며, **경미한 통증에는 사용하지 않습니다.**
- 비약물적 치료 또는 비마약성 진통제(아세트아미노펜, 이부프로펜 등) 사용을 우선하고 효과가 없거나 비마약성 진통제 사용에 제한이 있는 경우에 사용합니다.
- 기본적으로 **만 18세 미만의 환자는 사용하지 않습니다.**

3. ‘옥시코돈’은 얼마나 투여하나요?

- 투여량은 환자 개개인의 통증의 정도, 환자의 상태, 과거에 투여한 약물이나 현재 병용하는 약물 등을 종합적으로 고려하여 의사의 진단에 따라 조절해야 합니다.
- 제제 특성에 따라 4-6시간(속효성), 12시간(서방형) 마다 1정씩 투여합니다.

4. ‘옥시코돈’ 사용 시 주의사항은 무엇인가요?

- ‘옥시코돈’은 마약성 진통제로서 **오남용 가능성이 높은 약물**임을 항상 인식하고 **의사·약사 등 전문가의 지도에 따라 꼭 필요할 경우에만 복용**하여야 합니다.
- 다른 마약성 진통제, 수면제, 알코올 등 중추신경억제제를 함께 복용 시 호흡억제, 혼수 및 사망을 초래할 수 있으므로 각별히 주의하여야 합니다.
- 처방·조제 시 지도받은 구체적인 복용 방법, 복용 시 주의사항에 따라 복용하고, 씹고 부수거나 흡입하는 등 **이 약의 형태를 임의로 바꾸거나 다른 방법으로 변형하여 복용해서는 안 됩니다.**
- 투여 목적 이외의 사용을 하거나 타인에게 양도하지 않으며, 이 약이 불필요해졌을 경우 병원 또는 약국에 반납하도록 합니다.

※ 의료용 마약류의 취급내역은 「마약류 관리에 관한 법률」제11조에 따라 식품의약품안전처로 보고되고 있으며 모든 국민과 거주 외국인인 “**내 투약이력 조회 서비스**”를 통해 식약처로 보고된 **본인의 마약류 투약 이력 및 처방받은 마약류 안전정보**를 확인할 수 있습니다.

* 내 투약이력 조회 서비스 : data.nims.or.kr 혹은 모바일 앱 “마약류 안전정보 도우미”에서 제공