

## < 임상 재평가 결과 >

□ 제제 : S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염 제제(분류번호: 399, 전문)

□ 재평가 결과 공시 품목(2품목)

1. 사데닌정 (S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염) 초당약품공업(주)
2. 사메론정 (S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염) 신풍제약(주)

□ 재평가 결과

### ▶ 효능·효과

1. 우울증

### ▶ 용법·용량

1. 우울증

#### 1) 성인

- ① 개시요법 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 400 mg, 1일 2 ~ 3회, 15 ~ 30일 간 경구투여 한다.
- ② 유지요법 : 1회 200 mg, 1일 2 ~ 3회 경구투여 한다.

이 약은 씹거나 분쇄하지 말고 그대로 삼켜서 복용해야 한다.

<참고. 변경대비표>

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
효 능 효 과	1. 우울증 2. <u>활동성 퇴행성 관절증</u>	1. 우울증 2. <u>삭제</u>
용 법 용 량	1. 우울증 1) 성인 ① 개시요법 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 400 mg, 1일 2 ~ 3회, 15 ~ 30일 간 경구투여 한다. ② 유지요법 : 1회 200 mg, 1일 2 ~ 3회 경구투여 한다. 2. <u>활동성 퇴행성 관절증</u> 1) <u>성인 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 200 mg 1일 2회 식전 30분에 경구투여하며, 이 약으로서 1회 400 mg 1일 3회까지 증량하여 투여할 수 있다.</u> 이 약은 씹거나 분쇄하지 말고 그대로 삼켜서 복용해야 한다.	1. 우울증 1) 성인 ① 개시요법 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 400 mg, 1일 2 ~ 3회, 15 ~ 30일 간 경구투여 한다. ② 유지요법 : 1회 200 mg, 1일 2 ~ 3회 경구투여 한다. 2. <u>삭제</u> 이 약은 씹거나 분쇄하지 말고 그대로 삼켜서 복용해야 한다.