

[접종시기 및 접종대상]

Q1. 위탁의료기관을 전부 가동하지 않고, 일부 위탁의료기관 대상으로만 사업을 시행하는 이유가 있나요?

- 다인용 백신 접종에 따른 폐기량 최소화, 배송 효율화를 위해 대상자 규모가 제한된 초기에는 일부 위탁의료기관 대상으로 사업을 시행한 후 전체 의료기관으로 확대할 예정입니다.

Q2. 4월에 위탁의료기관이 조기가동 되는게 어떤 기관을 어떻게 선정하는지?

- 보건소에서 지역내 접종대상자 규모를 고려하여 4월 중에 접종이 가능한 위탁의료기관을 선정하여 조기 접종 위탁의료기관으로 지정함
 - 그 간 지자체와 계약체결된 위탁의료기관 중 준비된 의료기관을 먼저 지정하되, 보건소에서 관리 가능한 범위에서 시군구당 2~10개소 내외 지정 예정(전국 규모는 최대 3000개소 정도)

Q3. 의료기관 1차 접종 후 퇴직(이직)하였습니다. 2차 접종은 어떻게 해야 하나요?

- 동일 백신, 접종 대상 그룹이 동일한 경우 2차 접종은 대상자가 현재 속한 기관에서 접종 가능하나 해당 기관에서 접종이 불가능 할 경우 주소지와 상관없이 가까운 보건소와 일정을 조율하여 보건소에서 접종받을 수 있습니다.
 - * 지자체 공중보건역사, 군 의료인 전역자 등도 동일하게 적용 가능
- 위와 같은 경우 2차 접종 시행 전 해당 대상자 현황을 질병관리청에서 조사를 하여 <코로나19 예방접종관리시스템>에 일괄 반영할 예정입니다.
 - * 추후 안내 예정

**Q4. 사전예약 기간 이후에 취업을 하여 접종을 하지 못했습니다.
언제 접종 가능한가요?**

- 사전예약 기간 이후에 취업(신규 대상자)한 경우, 증빙 가능한 서류*를 지참하여 관할 보건소 또는 조기 접종 위탁의료기관에 방문하여 대상자로 등록합니다.
 - * 증빙서류: 장애인·노인방문 돌봄(소속된 복지관, 파견기관 등에서 발급한 재직증명서, 근로계약서 등), 보훈인력 돌봄(보훈처에 등록된 확인증), 항공승무원(재직증명서)
- 등록된 대상자는 조기 접종 위탁의료기관에 연락해서 접종 가능 여부를 확인하고, 위탁의료기관은 백신 잔량에 따라 접종합니다.

Q5. 병의원 및 약국 종사자는 구체적으로 누가 대상에 포함되나요?

- 병의원 종사자는 치과·한방병원 및 의원급 의료기관 내 보건의료인* 대상이며, 약국종사는 약사만 해당입니다.
 - * 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 간호조무사, 약사, 한약사, 임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 작업치료사, 치과기공사, 치과위생사, 보건의료정보관리사, 안경사, 응급구조사, 영양사, 위생사 보건교육사 포함

**Q6. 접종 당일 예진 상 고열 등으로 접종하지 못했습니다. 이후 언제
접종 가능한가요?**

- 예약 후 접종 당일 발열 등으로 접종이 제외되었던 대상자는 지정 의료기관에 연락하여 예약일을 변경한 후, 1차 접종 기간 내 접종을 완료합니다.

Q7. 접종 당일 예진 시 건강상태를 고려하여 접종 연기를 권하였으나, 본인이 접종을 강하게 원하는 경우 접종해야 하나요?

- 아니요. 본인이 접종을 희망하더라도 접종 당일 예진의사가 예진 시 접종이 어렵다고 판단하면 접종이 제외됩니다. 예진 시 '의학적 사유'로 접종 제외된 경우 정당한 사유를 명시해야 합니다.
 - * 예진의사는 본인이 접종을 희망하더라도 **접종제외사유**를 예진표에 기록 및 코로나19 예방접종 등록시스템에 예진결과 등록
- 접종 당일 제외되었던 대상자는 해당기관의 1차 접종기간 내 접종을 완료하면 됩니다.

Q8. 2분기 접종 대상이었는데 접종 거부 하였습니다. 이후 다시 접종 하고 싶다면 언제 접종 가능한가요?

- 예방접종을 거부하여 기한 내 예약을 하지 않을 경우 모든 국민이 접종 후 가장 후순위에 접종 가능합니다.

Q9. 백신 잔량으로 의료기관 옆 가게 종사자를 접종해도 되나요? 이럴 경우 등록을 어떻게 해야 하나요?

- 네, 접종 가능합니다. 지정 의료기관에서 백신잔여량으로 접종한 경우 접종대상자를 예약관리 메뉴*에서 인적정보 등록 후 접종력을 등록합니다.
 - * 시스템 매뉴얼은 접종시행 이전 추후 안내 예정

Q10. 이번에 접종하는 병의원급 의료기관은 병원급 의료기관 접종때와 같이 자체 접종인가요?

- 아닙니다. 이번에 접종하는 의료기관 접종대상은 치과병원, 한방병원 및 모든 의원급 의료기관 종사자가 대상인데, 백신 폐기량 감소를 위해 사전예약 후 인근 접종기관으로 선정된 위탁의료기관에서 접종할 예정입니다.

Q11. 선정된 위탁의료기관에서 병의원급 의료기관 종사자(치과병원, 한방병원 및 의원급 의료기관 종사자)를 접종시행한 경우 시행비 지급되나요?

- 네, 시행비 지급됩니다.
- 하지만, 조기 접종 위탁의료기관의 종사자는 자체접종 대상기관으로 시행비가 지급되지 않습니다.

Q12. 사전예약자가 12명 또는 1명 ~2명일때는 바이알을 개봉하나요?

- 아닙니다. 사전예약자가 12명일 경우에는 잔여량으로 접종합니다.
- 사전예약자가 1~2명일 경우에는 추가 사전예약자가 5명이 더해져서 최소 7명이 사전 예약된 경우, 예비명단이나 현장등록자를 포함하여 10명의 접종대상자를 만든 후, 백신 1바이알을 개봉할 수 있습니다.

Q13. 사전 예약자와 현장등록자를 접종할 경우, 어떤 경우를 비정상적인 접종으로 간주하나요?

○ 사전 예약자는 1~2명이고 예비명단이나 현장등록자 수가 나머지 8~9명일 경우처럼 현장등록자수가 더 많으면서, 2분기 접종대상자*가 아닌 자가 다수인 경우 비정상적인 접종으로 간주

* 장애인 · 노인 · 보훈인력 돌봄종사자, 항공승무원, 병의원 및 약국 종사자, 투석환자

[시스템]

Q14. 관내 의료기관이 시스템에 안보입니다. 어떻게 하면 되나요?

○ 위탁의료기관이 코로나19 사업 관련 서류 제출 및 보건소 승인이 완료되었는지 확인합니다.

Q15. 저희 직원을 입력했을 때 '이미 등록된 대상자입니다'라는 안내창이 나오는데 무슨 의미인가요?

○ 이미 다른 기관에 소속되어 입력된 경우입니다. 해당 내용은 개인정보를 포함하고 있어, 질병보건통합관리시스템 내 게시판에 해당인적 정보를 포함하여 변경 신청시 반영 가능합니다.

* 경로: 질병보건통합관리시스템 → 코로나19 예방접종관리 → 게시판 → QnA


[기타]

Q16. 코로나19 예방접종을 거부한 경우 구상권을 청구할 수 있나요?

- 아니요. 접종 여부는 본인이 선택할 수 있으며, 본인의 자발적인 동의하에서만 실시됩니다.
- 다만, 코로나19 유행의 효과적인 관리 및 피해 최소화를 위해 공중보건학적 목적에서 전 국민 접종을 추진하고 있으므로, 감염병 예방을 위해 접종을 독려해 주시기 바랍니다.

Q17. 예방접종을 완료한 경우 증명서는 어떻게 발급 받을 수 있나요?


- 국가예방접종사업과 마찬가지로, 접종 후 증명서의 발급은 예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 또는 정부24(<https://www.gov.kr>)를 통해 온라인으로 발급 받을 수 있습니다.


2021.02.25.

코로나19 예방접종, 나와 모두의 건강을 지킬 수 있습니다



코로나19 예방접종은
코로나19 대유행을 멈추기 위한
가장 효과적인 방법 중 하나입니다!



코로나19 예방접종 전·중·후 주의사항

예방접종 전



1. 사전 예약하기
2. 발열 등 호흡기 증상이 있을 경우 예방접종기관에 알린 후 예방접종 연기하기
3. (예방접종 전) 예방접종 받을 부위가 잘 보이는 옷을 준비

예방접종 시



1. 마스크 착용하기
2. 예진표를 꼼꼼히 작성하기

예방접종 후



1. 접종 후 15-30분간 접종기관에서 이상반응 관찰하기
2. 귀가 후 적어도 3시간 이상, 접종 후 최소 3일 주의 깊게 관찰하기

이런 분들은 코로나19 예방접종을 미뤄주세요!

- ▶ 코로나19 감염이 의심되는 경우
- ▶ 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자
- ▶ 발열(37.5℃) 등 급성병증이 있는 경우
- ▶ 임신부*와 만 18세 미만* 소아청소년
- *현재까지 안전성과 유효성 자료가 없으므로 접종대상지에서 제외

이런 분들은 예방접종을 받지 마세요!

1. 백신의 구성물질에 중증 알레르기 반응 (예, 아나필락시스) 발생 이력이 있는 경우
2. 첫 번째 백신 접종 후 아나필락시스 반응이 확인된 경우

코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 하나요?


- ▶ 이상반응이 의심되면 예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대응방법을 확인하세요.
- ▶ 그러나 39도 이상 고열이나 호흡곤란, 두드러기 등 증상이 나타나면 즉시 접종기관 또는 가까운 의료기관을 방문하세요.



코로나19 예방접종 후에도 감염예방 수칙을 지켜주세요

- ▶ 예방접종 후에도 마스크 착용, 손씻기, 사회적 거리 두기(최소 1m 이상)는 여전히 코로나19로부터 나와 우리를 지키는 예방법입니다.




2021.02.24.

코로나19 예방접종 후 안내

접종 당일



건강상태
좋을 때 접종



철저한 예진



안전한 접종



접종기관에서
이상 반응 관찰

코로나 예방접종 후 주의사항

- **접종 후 15~30분 동안 접종기관에 머무르며 이상반응이 나타나는지 관찰하기**
 - 특별한 알레르기가 없는 경우, 접종 후 15분간 관찰
 - 과거에 알레르기가 있었던 경우, 반드시 30분간 관찰
- **귀가 후 최소 3시간 이상 안정을 취하며 이상반응이 나타나는지 주의 깊게 관찰하기**
- **접종 후 최소 3일간 특별한 증상이 나타나는지 관심 기울이기**
 - 만약 39도 이상 고열이 있거나 평소와 다른 신체 증상이 나타날 시 바로 의사의 진료 받기
- **접종 당일과 다음날은 과격한 운동 및 음주 삼가**
- **접종 당일은 목욕을 하지 않는 것이 좋음**
- **접종 부위는 청결히 유지**
- **어르신의 경우, 예방접종 후 혼자 있지 말고 다른 사람과 함께 있어 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 하기**



코로나19 예방접종 후 안내

예방접종 후 이상반응

예방접종 후 흔하게 발생하는 증상

예방접종 후에 아래와 같은 증상이 흔하게 발생할 수 있으며 대부분 2~3일내 저절로 좋아집니다.



접종부위 통증, 부기, 발적



발열, 메스꺼움, 근육통



피로감



두통

예방접종 후, 이런 증상이 생기면



접종부위 통증이 있는 경우 깨끗한 수건으로 냉찜질을 해주세요.



미열이 있는 경우 수분을 충분히 섭취하고 쉬세요.



전신 통증이 있는 경우 진통제가 도움이 될 수 있습니다.



하지만, 증상이 심해지면 의료기관에 방문합니다.

코로나19 예방접종 후 이상반응 발생이 의심 되는 경우

예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>)을 통해 나의 증상을 확인해보고 대응방법을 안내받을 수 있습니다.



만일 심각한 알레르기 반응 (호흡곤란, 입술·입안의 부종, 두드러기 등)같은 증상이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하시기 바랍니다.



 예방접종 후 건강상태 확인하기
<https://nip.kdca.go.kr>

예방접종 후 이상반응 신고하기
<https://nip.kdca.go.kr> 



질병관리청

2021.02.24.

아나필락시스 증상 알기

아나필락시스는 매우 드물지만, 갑자기 발생하는 심각한 알레르기 반응입니다.

예방접종 후에는 **최소 15분간** 접종기관에 머물러 심각한 알레르기 반응 (아나필락시스)이 나타나지 관찰해야 하며, 이전에 다른 원인 (약, 음식, 주사 행위 등)으로 심한 알레르기 반응이 나타난 경험이 있는 경우에는 반드시 **30분간** 관찰하도록 합니다.

☑ 아나필락시스인지는 어떻게 알 수 있나요?

<ul style="list-style-type: none"> • 피부가 전신적으로 붉어지거나 두드러기가 생김 • 숨이 차고 쌉쌉거림 • 혀가 부음 • 목이 붓고 조이는 것 같음 	<ul style="list-style-type: none"> • 말하기 힘들고 목소리가 잠김 • 쌉쌉거리거나 기침을 계속 함 • 계속 어지럽거나 의식이 없음 • 참백하거나 늘어짐
---	--

※ 위의 증상 중 일부만 나타날 수도 있습니다.

아나필락시스 증상 알기


☑ **아나필락시스 증상이 나타나면 어떤 처치가 이루어지나요?**



01
편평한 곳에 눕히고,
의식과 맥박, 호흡을 확인합니다.



02
빨리 119에 연락하거나
주변에 도움을 청합니다.



03
에피네프린이 있으면,
주사하고 시간을 기록합니다.



04
다리를 올려서
혈액순환을 유지합니다.



05
산소가 있으면
마스크로 공급합니다.



06
2차 반응이 올 수 있으므로
응급실로 신속하게 이송합니다.

아나필락시스는 생명을 위협할 수도 있으므로 빠른 응급처치가 필요합니다.
위 아나필락시스 증상이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하시기 바랍니다.

☑ **집에 돌아간 후에 알레르기 반응이 나타나면 어떻게 해야 하나요?**

- 대부분 심한 알레르기 반응은 30분 이내 나타나지만, 귀가 후에도 알레르기 반응 [눈물, 콧물, 입술주위나 눈의 가려움증, 재채기, 발진]이 나타날 수 있습니다.
- 가벼운 알레르기 증상이 계속될 경우 항히스타민제 등 처치가 필요할 수 있으므로 의료기관을 방문하시기 바랍니다.

2021.02.23.

아나필락시스 대응 매뉴얼

01 예방접종 후 이상반응 모니터링



02 상황평가/도움 요청
환자를 혼자 두지 말 것, 필요시 119 구급대 신고



03 환자 기도확보/자세 조정
환자를 평평한 곳에 눕히며, 일어서거나 걷게 하지 말 것



04 에피네프린 투여
즉시 에피네프린을 전외측 대퇴근에 근육주사



05 산소투여
호흡곤란을 호소하는 경우(필요시) 기도내 삽관



06 에피네프린 투여 5분 후에
호전되지 않으면 에피네프린 2차 투여



07 구급차 이송
접종 기관이 병원이 아니라면 대기중인
구급차로 지정 응급센터로 이송



08 아나필락시스 발생기록



아스트라제네카 코로나19 백신 준비 및 예방접종

보관과 관리



2°C~8°C

- ▶ 미개봉 상태의 바이알은 냉장보관(2°C~8°C)
- ▶ 냉장보관(2°C~8°C) 시 최대 6개월간 보관 가능
- ▶ 직사광선을 피할 수 있도록 포장된 박스 상태로 보관
- ▶ 개봉한(첫 번째 접종량 추출 후) 바이알은 실온(최대 30°C)에서 최대 6시간 내에 사용 및 당일 폐기

예방접종 방법

01



백신냉장고에서 아스트라제네카
코로나19 백신 바이알 꺼내기.
백신은 투명하거나 약간 불투명하고,
입자가 없어야 함

02



무균술을 적용하여,
고무마개를 알코올 솜으로 닦고
자연 건조 시키기

03



첫 번째 사용 후 유효기간(사용안가일시)을
24시간 기법으로 바이알에 기입.
개봉한(첫 번째 접종량 추출 후) 바이알은
실온(최대 30°C)에서
최대 6시간 내에 사용 및 당일 폐기

04



백신액을 1mL 접종용
주사기로 0.5mL 추출

05



바이알에 접종용 주사기를
꿨은 채로 공기 방울을 제거

06



0.5mL가 추출되었는지 확인

07



상완의 삼각근에 근육주사 접종
(8~12주 간격 2번)

08



예방접종 후 주사기 등은
손상성 폐기를 전용용기에 폐기

09



개봉한 바이알이나
유효기간이 지난 바이알은 폐기.
바이알 상태 그대로 별도의 보관함에
분리하여 유통업체에서 회수 시까지 보관.

