

메틸페니데이트염산염 단일제(경구제) 사용상의 주의사항 변경대비표

통일조정 대상품목	변경항목	변경 전	변경 후
명인제약(주) 메디키네티타드캡슐5mg(메틸페니데이트염산염) 등 5개 품목	6. 상호작용	<p><신 설></p> <p>6) 이 약의 복용 중 할로겐화 마취제 투여시, 수술하는 동안 갑작스런 혈압 상승의 위험이 있다. 수술 당일에는 메틸페니데이트의 치료를 중단해야 한다.</p>	<p>3) 이 약은 고혈압 치료에 사용되는 약물의 효과를 감소시킬 수 있다. 혈압 모니터링과 필요에 따라 고혈압 치료제의 용량을 조절하는 것이 권장된다.</p> <p>4) 할로겐화 마취제와 이 약의 병용은 수술 중 혈압과 심박수가 갑자기 상승할 위험을 증가시킨다. 수술 당일에는 메틸페니데이트의 치료를 중단해야 한다.</p>
한국먼디파마(유) 비스펜틴조절방출캡슐10mg (메틸페니데이트염산염) 등 4개 품목	6. 상호작용	<p><신 설></p> <p>6) 이 약의 복용 중 할로겐화 마취제 투여시, 수술하는 동안 갑작스런 혈압 상승의 위험이 있다. 수술 당일에는 메틸페니데이트의 치료를 중단해야 한다.</p>	<p>3) 이 약은 고혈압 치료에 사용되는 약물의 효과를 감소시킬 수 있다. 혈압 모니터링과 필요에 따라 고혈압 치료제의 용량을 조절하는 것이 권장된다.</p> <p>4) 할로겐화 마취제와 이 약의 병용은 수술 중 혈압과 심박수가 갑자기 상승할 위험을 증가시킨다. 수술 당일에는 메틸페니데이트의 치료를 중단해야 한다.</p>
명인제약(주) 페로스핀정10밀리그램(메틸페니데이트염산염) 등 2개 품목 및 환인제약(주) 페니드정10밀리그램(메틸페니데이트염산염) 등 3개 품목	6. 상호작용	<p>3) 이 약은 고혈압을 치료하기 위해 투여한 약물의 효과를 감소시킬 수 있다. 이 약은 우선 산화적 경로가 아닌 탈에스테르화에 의해 <i>ritalinic acid</i>로 대사된다.</p> <p>8) 할로겐화 마취제의 병용 시 수술 중 갑작스런 혈압 상승의 위험이 있다. 수술이 예정되어 있는 경우 이 약은 수술 당일에 투여할 수 없다.</p>	<p>3) 이 약은 고혈압 치료에 사용되는 약물의 효과를 감소시킬 수 있다. 혈압 모니터링과 필요에 따라 고혈압 치료제의 용량을 조절하는 것이 권장된다.</p> <p>4) 할로겐화 마취제와 이 약의 병용은 수술 중 혈압과 심박수가 갑자기 상승할 위험을 증가시킨다. 수술 당일에는 메틸페니데이트의 치료를 중단해야 한다.</p>