

경구용 코로나19 치료제 ‘팍스로비드’ 복약설명서



QR코드를 찍으면 자세한
[환자 및 보호자용 설명서]
를 확인할 수 있습니다.

제품명	팍스로비드정		
성분 / 함량	니르마트렐비르 150mg (1정당)	리토나비르 100mg	
성상	니르마트렐비르 2정과 리토나비르 1정이 함께 포장된 제품 ● 니르마트렐비르 분홍색 정제 2개 ● 리토나비르 흰색 정제 1개		
용법 / 용량	<ul style="list-style-type: none">니르마트렐비르 2정과 리토나비르 1정을 함께 1일 2회 5일간 총 10회 복용코로나19 양성판정을 받고 증상발현 후 5일 이내에 투여 시작 <p>* 중등도 신장애 환자의 경우 니르마트렐비르 1정 + 리토나비르 1정으로 감량 할 수 있습니다.</p>		
효능 / 효과	PCR 검사 등을 통해 코로나바이러스감염증-19가 확진된 환자로서 중증으로 진행될 위험이 높은 경증 및 중증증 성인 및 소아 (12세 이상, 체중 40kg이상) 환자의 치료		
저장방법	15°C ~ 30°C 실온 보관		

‘팍스로비드’ 어떻게 복용하나요?



니르마트렐비르

리토나비르

한번에 정제 3개를 모두 복용



1일 2회 총 10회분 중단 없이 복용

- 식사와 관계없이 복용 가능, 5일간 총 10회분 **복용 중단 없이 치료과정을 완료**하는 것이 중요합니다.
- 12시간 간격으로 복용**해야 하므로 첫 회차 복용 시간을 생활 습관 상 잊지 않고 복용하기 편한 시간으로 정해주세요. 예) 오전 9시 / 오후 9시

유의사항

약 복용을 잊은 경우

조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 연락하시고 아래와 같이 복용하세요.

① 복용을 잊은지 8시간 이내인 경우

- 인지한 시점에 바로 복용하고 다음 회차는 원래 정해진 시간에 복용
- 이후 복용 시간 원래대로 유지

② 복용을 잊은지 8시간 초과인 경우

- 인지한 시점에는 약을 먹지 않고 예정된 다음 회차에 복용
- 이후 복용 시간 원래대로 유지

한꺼번에 두 배의 용량을 복용하지 마세요

팍스로비드를 복용하기 전에 약사에게 알려야 할 사항은 무엇인가요?

약사에게 아래 사항에 해당되는 경우에 알려주세요

- 약물 알레르기가 있는 경우
- 수유 중인 경우
- 간질환 또는 신장질환이 있는 경우
- 중대한 질환이 있는 경우
- 임신했거나 임신 예정인 경우

전문의약품 및 일반의약품, 비타민 등 영양제, 생약 보조제를 포함하여
현재 복용 중인 모든 의약품을 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알려주세요.

약 복용 중간에 추가로 새로운 의약품을 복용하게 될 경우
조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알린 후 새로운 약을 복용하세요.

이 약 복용 후에 나타나는 이상사례는 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알려주세요.



식욕부진
미각변화



짙은 색 소변
창백한 색 변



설사



근육통



고혈압

** 이러한 증상 이외에도 다른 부작용이 있을 수 있습니다.

의약품 부작용에 대한 피해구제에 대해 상담을 받거나 신청하고자 하는 경우 한국의약품안전관리원
(<http://www.karp.drugsafe.or.kr>, ☎ 1644-6223)으로 연락하시기 바랍니다.

팍스로비드를 복용중단하게 되면 남은약은 어떻게 하나요?

- 이 약 복용 후 이상 반응 등 증상 발생에 따른 투약중지 시, 잔여 치료제는 반납·폐기가 원칙입니다.
- 의사의 진단·처방없이 타인에게 투약하는 것은 매우 위험하며, 관련 법상 처벌될 수 있습니다.
- 남은 약 폐기 방법



① 소독제 등으로 소독 후
지퍼백 등에 밀봉하여 보관



② 격리해제 후 일주일 이내



③ 인근 약국 또는 보건소
수거함에 폐기

* 기타 자체별 폐의약품 수거방식 활용 가능