

\*첨부: 코로나바이러스감염증-19 경구용 치료제 서면 복용지도서

# 경구용 코로나19 치료제 ‘팍스로비드’ 복용설명서



QR코드를 스캔하면 서면 복용지도서를 보실 수 있습니다.  
 (본서 및 복용지도서를 함께 보실 수 있습니다.)


제품명	팍스로비드정		
성분 / 함량	니르마드렌비르 150mg (1정당)	리도나비르 100mg	
성상	니르마드렌비르 2정과 리도나비르 1정이 함께 포장된 제품 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 니르마드렌비르 분홍색 정제 2개</li> <li>● 리도나비르 흰색 정제 1개</li> </ul>		
용법 / 용량	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 니르마드렌비르 2정과 리도나비르 1정을 함께 1일 2회 5일간 총 10회 복용</li> <li>● 코로나19 임상관정을 받고 증상발현 후 5일 이내에 두어 시작</li> <li>● 정제를 씹거나 부수지 말고 통째로 삼키세요.</li> </ul> <small>* 중등도 손상에 환자의 경우 니르마드렌비르 1정 + 리도나비르 1정으로 감량할 수 있습니다.</small>		
효능 / 효과	PCR 검사 등을 통해 코로나바이러스감염증-19가 확진된 환자로서 중증으로 진행될 위험이 높은 중증 및 중등증 성인 및 소아(12세 이상, 체중 40kg 이상) 환자의 치료		
저장방법	15°C ~ 30°C 실온 보관		

## ‘팍스로비드’ 어떻게 복용하나요?

| 한 번에 정제 3개를



| 1일 2회 복용 |



| 5일간 총 10회분 복용 |

- 식사와 관계없이 복용 가능합니다.
- 5일간 총 10회분 복용 중단 없이 치료과정을 완료하는 것이 중요합니다.
- 12시간 간격으로 복용해야 하므로 첫 회차 복용 시간을 생활 습관 상 잊지 않고 복용하기 편한 시간으로 정해주세요. 예) 오전 9시 / 오후 9시

## ‘약 복용을 잊은 경우’ 유의사항

조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 연락하시고 아래와 같이 복용하세요.

### ① 복용을 잊은지 8시간 이내인 경우

- 인정한 시점에 바로 복용하고 다음 회차는 원래 정해진 시간에 복용
- 이후 복용 시간 원래대로 유지

### ② 복용을 잊은지 8시간 초과인 경우

- 인정한 시점에는 약을 먹지 않고 예정된 다음 회차에 복용
- 이후 복용 시간 원래대로 유지

※ 한꺼번에 두 배의 용량을 복용하지 마세요

기타 팍스로비드 복용방법 등에 대한 문의는 조제약국 혹은 제조사인 한국화이자제약 콜센터 1533-1900로 연락하시기 바랍니다.

## 팍스로비드를 복용하기 전에 약사에게 알려야 할 사항은 무엇인가요?

### 약사에게 아래 사항에 해당되는 경우에 알려주세요

- 약물 알레르기가 있는 경우 • 간질환 또는 신장질환이 있는 경우
- 수유 중인 경우 • 중대한 질환이 있는 경우 • 임신했거나 임신 예정인 경우

전문의약품 및 일반의약품, 비타민 등 영양제, 생약 보조제를 포함하여  
**현재 복용 중인 모든 의약품**을 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알려주세요.

약 복용 중간에 추가로 새로운 의약품을 복용하게 될 경우  
 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알린 후 새로운 약을 복용하세요.

이 약 복용 후에 나타나는 이상사례는 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알려주세요.  
 아래의 방법에 따라 **한국약품안전관리원**으로 부작용을 보고하시거나 상담전화  
 (☎1644-6223)로 문의하실 수 있습니다.

**부작용 상담·신고채널**  
 한국약품안전관리원 | 온라인 보고(신고) : kaers.drugsafe.or.kr  
 전화상담 : 1644-6223



식욕부진  
미각변화



질은 색 소변  
창백한 색 변



실사



근육통



고혈압

\*\* 이러한 증상 이외에도 다른 부작용이 있을 수 있습니다.

의약품 부작용에 대한 피해구제에 대해 상담을 받거나 신청하고자 하는 경우 한국약품안전관리원  
 (<http://www.karp.drugsafe.or.kr>, ☎ 1644-6223)으로 연락하시기 바랍니다.  
 '팍스로비드'를 복용한 후 부작용으로 인해 입원 치료 등 중대한 피해가 발생한 환자 등은  
 '의약품부작용피해구제'를 신청할 수 있으며, 부작용 간의 인과성이 인정되는 경우 피해보상이 가능합니다.

## 팍스로비드를 복용중단하게 되면 남은약은 어떻게 하나요?

- 이 약 복용 후 이상 반응 등 증상 발생에 따른 투약중지 시, 잔여 치료제는 반납·폐기가 원칙입니다.
- 의사의 진단·처방없이 타인에게 투약하는 것은 매우 위험하며, 관련 법상 처벌될 수 있습니다.
- 남은 약 폐기 방법



① 소독제 등으로 소독 후  
지퍼백 등에 밀봉하여 보관



② 격리해제 후 일주일 이내



③ 인근 약국 또는 보건소  
수거함에 폐기

\* 기타 지자체별 폐의약품 수거방식 활용 가능